

COVID-19 : PCR

REALISATION DU PRELEVEMENT NASO PHARYNGE

- ➔ le préleveur doit s'équiper de moyens de protection appropriés (*lunettes, surblouse, masque, gants et charlotte*)
- ➔ Se désinfecter 30 sec les mains avec une SHA, mettre les gants
- Récupérer la fiche de renseignements complétée
- Vérifier : nom, prénom, date de naissance du patient
- Se placer sur le côté du patient à 90° et pas en face pour limiter les risques de projections
- Maintenir la tête par derrière avec l'autre main si nécessaire (le patient recule sa tête par reflexe)
- enfoncer l'écouvillon jusqu'au fond des fosses nasales (c'est loin ! / on sent la butée au fond) = jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée (une résistance doit être nettement perçue pour que le prélèvement soit efficace)
- faire rouler l'écouvillon entre les doigts afin de prélever le mucus
- retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher l'orifice narinaire
- utiliser le même écouvillon avec l'autre narine
- décharger sans casser pendant au moins 10 secondes l'écouvillon dans le tube SANSURE (bouchon bleu)
- jeter l'écouvillon dans une poubelle DASRI



IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

- Désinfecter le tube avec un antiseptique adapté
- Identifier le tube, le mettre dans le sachet et le sceller
- Mettre l'ordonnance et la fiche de renseignement dans la poche du sachet

ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Acheminer dans la journée le tube au laboratoire

COVID-19 : PCR

REALISATION DU PRELEVEMENT NASO PHARYNGE

- ➔ le préleveur doit s'équiper de moyens de protection appropriés (*lunettes, surblouse, masque, gants et charlotte*)
- ➔ Se désinfecter 30 sec les mains avec une SHA, mettre les gants
- Récupérer la fiche de renseignements complétée
- Vérifier : nom, prénom, date de naissance du patient
- Se placer sur le côté du patient à 90° et pas en face pour limiter les risques de projections
- Maintenir la tête par derrière avec l'autre main si nécessaire (le patient recule sa tête par reflexe)
- enfoncer l'écouvillon jusqu'au fond des fosses nasales (c'est loin ! / on sent la butée au fond) = jusqu'au contact de la paroi rhino-pharyngée (une résistance doit être nettement perçue pour que le prélèvement soit efficace)
- faire rouler l'écouvillon entre les doigts afin de prélever le mucus
- retirer l'écouvillon dans l'axe et prendre garde à ne pas toucher l'orifice narinaire
- utiliser le même écouvillon avec l'autre narine
- décharger sans casser pendant au moins 10 secondes l'écouvillon dans le tube SANSURE (bouchon bleu)
- jeter l'écouvillon dans une poubelle DASRI



IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

- Désinfecter le tube avec un antiseptique adapté
- Identifier le tube, le mettre dans le sachet et le sceller
- Mettre l'ordonnance et la fiche de renseignement dans la poche du sachet

ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Acheminer dans la journée le tube au laboratoire